

Cell Systems社/ACBRI社 正常細胞培養法

■適応培地 ■

1. CS-C 培地キットR(注文Cat.No. CS4Z0500R):有血清培地
2. CS-C 無血清培地キットR(注文Cat.No. CSSF4Z0500R):無血清培地

■試薬 ■

1. リン酸緩衝液(-):PBS(-)
2. 継代試薬セット(注文Cat.No. CS4Z0800)
 - 0.02%EDTA 溶液 100mL
 - 0.25%トリプシン/0.02%EDTA 溶液 100mL
 - トリプシンインヒビター溶液 100mL

■培地キット使用方法 ■

培地の調製方法

- ① 基礎培地とCell Boost(Culture Boost) or Rocket Fuel を使用します。
- ② 基礎培地とCell Boost(Culture Boost) or Rocket Fuel を融解し、37°Cの浴槽中で温める。
- ③ 基礎培地にCell Boost(Culture Boost) or Rocket Fuel を全量添加し、培地を調製する。
- ④ 調製した培地は冷蔵保存し、30 日以内に使用する。

Attachment Factor 使用方法

- ① Attachment Factor を融解し、37°Cの浴槽中で温める。
- ② 培養器材の表面をAttachment Factor で浸し、よく馴染ませる。(基材表面が薄く浸る程度が良い。)
- ③ Attachment Factor を吸引除去する。(Attachment Factor の洗浄操作、乾燥操作は不要です。)
(Type1 コラーゲンなどでコーティングした容器をご使用の場合は、特にコーティングの必要はありません。)

■細胞の受入 ■

培養細胞の場合

- ① 入荷したらすぐに開梱し、フラスコの破損、液漏れをチェックする。
- ② 70%アルコールでフラスコの外部をよく拭く。
- ③ 顕微鏡で細胞の萎縮、剥離などを観察し、異常がなければフラスコを密栓したまま(シールをはがさず)37°Cで一昼夜静置する。

※細胞は、出荷時に当社で状態を確認した上でお送りしていますが、輸送事故などにより、細胞が何らかのダメージを受けている場合がありますので、必ず静置してください。

凍結細胞の場合

- ① 入荷したら直ぐに箱からバイアルを取り出し、液体窒素にて保管する。

■細胞の融解 ■

- ① 凍結アンプルを37°Cの温水中で攪拌しながら、すばやく溶かす。
- ② 融解後、アルコール綿でキャップの周りをよく拭く。
- ③ バイアルを開封し、内容物(細胞懸濁液)を、培地10mLを入れた遠心管に移す。
- ④ 軽くピペティングした後、1000rpmで5分間遠心する。
- ⑤ 上清を除き、ペレットを1mLの培地で懸濁し、25cm²フラスコあるいは、60mmシャーレに播種する。



■細胞の継代■

- ① あらかじめ培地・試薬類を室温に戻し、容器のまわり特にキャップ付近を70%アルコールでよく消毒する。
- ② フラスコ内の培地を抜き取る。この際細胞層を傷つけないよう注意する。
- ③ 0.02%EDTA 溶液約10mL を加え、細胞層をリンスし、溶液を捨てる。(PBS(-)で代用可能)
- ④ 0.25%トリプシン/0.02%EDTA 溶液を2mL 加え、顕微鏡にて細胞を観察する。
- ⑤ 細胞が丸くなりつつあれば、トリプシンインヒビター溶液を約2mL加える。

※トリプシン処理時間が長いと細胞の状態が悪くなります。通常、1分ほどで処理できます。

- ⑥ パスツールピペットでピペッティングして、細胞を剥がし、遠心管へ移す。

※遠心管は10~15mL の容量で、先のとがったものをご使用ください。

- ⑦ フラスコに培地を約5mL 加え、残った細胞を懸濁、回収し⑥の遠心管へ移す。
- ⑧ 100G(約800rpm)で1分間遠心する。
- ⑨ 上清を捨て、細胞沈査に既知量の培地を加える。(例えば、1mL)
- ⑩ 細胞をピペッティングで再浮遊させ、細胞数を測定する。
- ⑪ 新しいフラスコに培地5mL(25cm²フラスコの場合)を加え、細胞を播種する。

※植え込む細胞数は、 1×10^5 cells/mL、または、Split Ratio=1:3

培地量:25cm²フラスコ 5mL
96wellプレート 100~150 μ L/well
24wellプレート 1.0~1.5mL/well

- ⑫ 新しく植え込んだフラスコのキャップをゆるめて、37°C、5%CO₂下で培養する。
- ⑬ 翌日、顕微鏡で観察し、培地中に浮遊物が多い場合は、培地を交換する。(以降2日おきに培地交換を行う。)
- ⑭ 細胞がセミコンフルエントな状態になったら、継代する。

■細胞の凍結保存■

当社取り扱い製品の「TCプロテクター(注文Cat.No. KBTCP001)」の使用が便利です。

- ① 細胞が80%シート時に培地を交換し、翌日に凍結保存を行う。
- ② 細胞を継代時と同様の方法で、回収し、遠心する。
- ③ TCプロテクターで 1×10^6 cells/mL となるように懸濁し、凍結バイアルに1-2mLずつ分注する。
- ④ -80°Cのディープフリーザーで凍結する。なお、液体窒素で保管する場合には翌日移す。

株式会社ケー・イー・シー
試薬事業部

〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目1-20

(お問い合わせ窓口)

TEL: 06-6435-9747 FAX: 06-6435-9748

URL: <http://www.kacnet.co.jp/>

E-mail: cs-info@kacnet.co.jp